CALIMEC

Antiparasitario externo
Endectocida de amplio espectro

CALIER - All rights reserved

FORMA FARMACEÚTICA:
Injectable solution

COMPOSICIÓN:
Doramectina 1%
Agentes de formulación c.s.p. 100%

INDICACIONES:
Bovino:
- Tratamiento y control de larga acción de parasitosis debido a nematodes gastrointestinales, gusanos redondos gastrointestinales (adulto y cuarto estadío de larvas): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata, Haemonchus contortus, Haemonchus placei, Haemonchus similis, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus longispicularis, Cooperia oncophora* (incluyendo larvas inhibidas), Cooperia surnabada (sin. memasteri), Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger, Bunostomum phlebotomum, Strongyloides papillosus, Oesophagostomum radiatum, Trichuris discolor. Lombriz del pulmón (adultos y cuarto estadío de larvas): *Dictyocaulus viviparus.*
- Ectoparásitos: Garrapata: *Boophilus microplus*; Parásitos del ojo: *Thelazia spp.*; Ura (estadios parasitarios): *Hypodrema bovis, Hypodrema lineatum, Dermatobia hominis*; Ayuda en el control de bicheras (miasis): estadios parasitarios: *Cochliomyia hominivorax*; Piojos: *Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenoptes capillatus, Damalinia bovis*; Ayuda en el control de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) por su acción sobre el ciclo parasitario; Sarna: *Psoporpotes bovis.*
Ovino:
- Tratamiento y control de larga acción de parasitosis debido a nematodes gastrointestinales, gusanos redondos gastrointestinales (adulto y cuarto estadío de larvas): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata, Haemonchus contortus, Haemonchus placei, Haemonchus similis, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus longispicularis, Cooperia oncophora* (incluyendo larvas inhibidas), *Cooperia surnabada (sin.memasteri), Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger, Bunostomum phlebotomum, Strongyloides papillosus, Oesophagostomum radiatum, Trichuris discolor.* Lombriz del pulmón (adultos y cuarto estadío de larvas): *Dictyocaulus viviparus.*
- Ectoparásitos: Parásitos del ojo: *Thelazia spp.*; Ura (estadios parasitarios): *Dermatobia hominis*; Ayuda en el control de bicheras (miasis): estadios parasitarios: *Cochliomyia hominivorax*; Sarna: *Psoporpotes ovis; Sarcoptes scabiei.*
Porcino:
- Tratamiento y control de larga acción de parasitosis debido a nematodes gastrointestinales, gusanos redondos gastrointestinales (adulto y cuarto estadío de larvas): *Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Strongyloides ransomi* (adultos), *Oesophagostomum dentatum, Oesophagostomum quadrispinulatum, Trichuris suis.* Lombriz del pulmón (adultos): *Metastrongylus spp.* Lombriz del riñón: *Stephanurus dentatum.*
- Ectoparásitos: Piojos chupadores: *Haematopinus suis*; Ayuda en el control bicheras (miasis): estadios parasitarios: *Cochliomyia hominivorax*; Sarna: *Sarcoptes scabiei.*

POSOLOGÍA:
Bovino:
- Vía inyectable subcutánea o intramuscular a la dosis de 1 ml de Calimec cada 50 kg de peso vivo (200 mcg de Doramectina por kg de peso vivo).
- Para el uso contra garrapata del bovino en zona infestada (sucia), zona de erradicación y zona indemne, repetir la aplicación cada 21 días.
Ovino:
- Vía inyectable subcutánea o intramuscular a la dosis de 1 ml de Calimec cada 50 kg de peso vivo (200 mcg de Doramectina por kg de peso vivo).

- En casos de Sarna Ovina, el tratamiento se repetirá a los 7 días de la primera aplicación.
Porcino:
- Vía inyectable intramuscular a las dosis de 1 ml de Calimec cada 33 kg de peso vivo (300 mcg de Doramectina por kg de peso vivo).

CONTRAINDICACIONES:
No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a la doramectina. No usar en perros de la raza Collie y sus cruzas.

TIEMPO DE ESPERA:
Carne: 35 días.
Leche: No administrar a vacas en período de lactación.

Producto de origen:
Uruguay

PRESENTACIÓN:
20 ml / 50 ml / 100 ml / 200 ml / 500 ml / 1000 ml.

LABORATORIOS CALIER
DE URUGUAY, S.A.
Camino Carrasco 6262
CP 11500 Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2606 2056* / Fax: (+598) 2604 5127
E-mail: laboratorios@calier.com.uy
www.calier.com.uy

CALIER - All rights reserved