

Infervac

Especialidad inmunológica de uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Células inactivadas de <i>Propionibacterium acnes</i>	0,25 mg
Lipopolisacárido de células de <i>E. coli</i>	0,02 mg
Timerosal	0,1 mg
Excipiente c.s.p.	1 ml

INDICACIONES:

Perros: Reduce mortalidad, síntomas clínicos y/o lesiones producidas por la infección por el Parvovirus canino. Reduce síntomas clínicos y/o lesiones producidas por la Demodicosis.

ESPECIES DE DESTINO: Perros.

DOSIS, MODO Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular o intravenosa lenta: Administrar 1 ml de INFERVAC en perros con un peso vivo igual o inferior a 10 Kg y 2 ml en perros con un peso superior a 10 Kg.
Repetir a las 48 horas si es necesario.

Tratamiento de la parvovirosis: aplicar junto a la terapia convencional, mediante perfusión intravenosa a través de la fluidoterapia.

Tratamiento de la Demodicosis: aplicar junto a la terapia convencional.

CONTRAINDICACIONES: No administrar conjuntamente con inmunosupresores.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA: No administrar Infervac durante la gestación y la lactancia.

EFFECTOS INDESEABLES: No se han descrito.

SOBREDOSIS: Ensayos realizados con concentraciones dos veces superiores a la dosis terapéutica no han evidenciado fenómenos de toxicidad local y/o general.

PRECAUCIONES DE USO: Agitar antes de usar.

TIEMPO DE ESPERA: No precisa.

CONSERVACION: Mantener entre 2°C y 8°C y al abrigo de la luz. No congelar.

PRESENTACIÓN: Envases de 4 ml, 10 ml y 20 ml.

Reg. n° 6870 (Paraguay)

Reg. n° A-2888 (Uruguay)

Reg. n° RF-6285-12 (Panamá)

Fabricado por:



LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/Barcelonès, 26 (El Ramassar)
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona) España